

# Diminuer la mortalité des agneaux : les étapes clés

## LA MISE EN LUTTE

### AVANT

→ **Réformez** sans état d'âme les femelles de plus de 6 ans, celles qui présentent des problèmes de dents, un quartier mammitique, les mauvaises laitières et celles qui ont avorté plusieurs fois. Les identifier avec une marque durable et les mettre à part.



→ **Vaccinez** contre les maladies abortives si cela se justifie.



→ Réalisez toutes les interventions sur le troupeau afin de **ne pas manipuler** les brebis pendant la lutte et au cours des trois semaines qui suivent : parage, tonte, déparasitage...



### PENDANT

→ **Limitez la période de lutte** à 2 cycles soit 40 jours en fin d'été et d'automne, à 3 cycles soit 60 jours (effet mâle) au printemps et en début et milieu d'été. 80 % des agnelages sont ainsi groupés sur 3 semaines à condition de respecter un nombre de béliers suffisant.



## LA GESTATION

### 45 JOURS APRÈS LE RETRAIT DU BÉLIER

→ Réalisez un **diagnostic de gestation** afin de différencier les brebis qui portent un seul agneau de celles qui portent des multiples dans le dernier mois de gestation. Cette pratique se justifie surtout pour des taux de prolificité de 130 à 180 % et pour trier les brebis vides.



→ **Triez les brebis maigres** et offrez leur une ration plus riche en énergie.



### UN MOIS AVANT LA MISE BAS

→ **Augmentez la ration** des brebis en énergie et azote en l'adaptant si possible à la taille de la portée. **Les compléter en sélénium** si nécessaire. Rationner les fourrages trop encombrants : enrubannage, regain.



→ Si vous déplorez des avortements, **faites intervenir votre vétérinaire sanitaire** dès que le seuil de 4 % est dépassé afin d'avoir un diagnostic.



## L'AGNELAGE

→ Travaillez dans une **bergerie organisée** et correctement ventilée. Curage, lavage et désinfection associés à un vide sanitaire sont conseillés avant la rentrée des brebis en bergerie.



→ **Surveiller** les mises bas au cours de la journée et faire téter dans les 4 heures qui suivent la naissance les nouveaux nés qui ne l'ont pas fait tout seul.



→ **Paillez** abondamment et très régulièrement les aires paillées et une à deux fois par jour les cases d'agnelage.



→ **Désinfectez** les nombrils le plus tôt possible après la naissance et les boucles à la pose.



→ **Allotez** les jeunes agneaux par classe d'âge.



## LE MOIS SUIVANT

→ **Anticipez** les traitements antiparasitaires collectifs, notamment contre la coccidiose, et réaliser les vaccinations programmées sur les agneaux. D'une façon générale, soyez attentif à leur santé.




### EN RÉSUMÉ :

- Alimentation équilibrée
- Génétique
- Hygiène
- Colostrum
- Bergerie adaptée
- Vaccination (si nécessaire)
- Surveillance
- Rigueur
- Réactivité

### ENQUÊTES EN ÉLEVAGES : LES CHIFFRES CLÉS

- 14 % de mortalité jusqu'à 60 jours pour un taux de prolificité moyen de 152 %
- Les 3 premières causes de mortalité identifiées par les éleveurs :
  - Très petit : 17 %
  - Problème de tétée : 11 %
  - Mort subite/entéro : 11 %

Répartition des taux de mortalité par âge des agneaux jusqu'à 60 jours



### POUR PLUS D'INFORMATIONS

- Consultez le document « Diminuer la mortalité des agneaux, c'est possible ! »
- Connectez-vous sur <http://umt-sante-petits-ruminants.idele.fr> et [www.reconquete-ovine.fr](http://www.reconquete-ovine.fr)
- Contactez votre technicien et votre vétérinaire

Document rédigé par : Laurence Sagot (Ciirpo/Institut de l'Élevage) avec le concours de Fabien Corbière (École Nationale Vétérinaire de Toulouse) et Jean-Marc Gautier (Institut de l'Élevage) et Marion Comel (Ciirpo/Institut de l'Élevage).